

**BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)**


1.	En cas de dégâts de gros gibier à une parcelle agricole, celui qui s'estime lésé adresse sa requête pour la réparation des dommages	a)	au juge de paix.	b)	au Département de la nature et des forêts.	c)	au commissaire de la zone de police locale.
2.	Lors d'une battue, les traqueurs	a)	doivent être munis d'un permis de chasse.	b)	doivent être munis d'une licence de chasse.	c)	n'ont pas besoin de permis de chasse ou de licence de chasse.
3.	La superficie minimale d'un seul tenant exigée par la loi pour pratiquer la chasse du faisan commun au nord du sillon Sambre et Meuse est de	a)	1 ha.	b)	25 ha.	c)	50 ha.
4.	Parmi les espèces d'oiseaux citées ci-après, indiquez celle qui est classée comme gibier d'eau par la loi sur la chasse.	a)	Le Grand Cormoran.	b)	La Bécassine des marais.	c)	Le Goéland argenté.
5.	La recherche sur le terrain d'autrui d'un gibier blessé est admise	a)	en tout temps, sans formalité préalable.	b)	moyennant l'autorisation du titulaire du droit de chasse sur ce terrain.	c)	moyennant avertissement préalable du titulaire du droit de chasse sur ce terrain ou de son garde assermenté.
6.	Laquelle des 3 espèces gibiers suivantes pouvait faire l'objet d'un lâcher le 1 <sup>er</sup> septembre 2020 ?	a)	Le Faisan commun.	b)	La Perdrix grise.	c)	Le Canard colvert.
7.	Laquelle de ces 3 espèces peut être chassée à l'affût durant l'heure qui suit le coucher du soleil ?	a)	La Sarcelle d'hiver.	b)	La Foulque macroule.	c)	Le Canard colvert.
8.	Lors de la saison de chasse 2020-2021, la chasse à l'approche et à l'affût du brocard était ouverte à partir du	a)	15 juillet.	b)	1 <sup>er</sup> août.	c)	15 août.

9.	Le Lapin peut être détruit à l'aide	a)	d'oiseaux de proie légalement détenus.	b)	de collets.	c)	de boîtes à fauves.
10.	Un restaurant peut-il légalement présenter sur sa carte un plat à base de Bécasse des bois un 20 janvier ?	a)	Non, en aucun cas.	b)	Oui, s'il s'agit d'une bécasse des bois provenant d'un élevage.	c)	Oui, si la bécasse des bois a été tirée en Région wallonne.
11.	L'apposition d'un bracelet entre le tendon et l'os d'une des pattes arrières de l'animal est exigée	a)	pour le transport de tout grand gibier en Région wallonne, quelle que soit l'origine de celui-ci.	b)	pour le transport de tout grand gibier tiré sur un territoire de chasse en Région wallonne.	c)	uniquement pour le transport d'un cerf tiré en application du plan de tir.
12.	Quelle est l'espèce ou quelles sont les espèces gibier soumise(s) à un plan de tir réglementaire en Région wallonne ?	a)	Le Cerf.	b)	Le Cerf, le Sanglier, le Chevreuil, le Daim et le Mouflon.	c)	Le Cerf, la Perdrix et le Lièvre.
13.	Tout nourrissage du grand gibier au nord du Sillon Sambre et Meuse est	a)	toujours interdit.	b)	soumis à autorisation, ainsi qu'au respect de certaines conditions.	c)	soumis à avertissement préalable, ainsi qu'au respect de certaines conditions.
14.	Indiquez parmi les animaux cités ci-après celui qui est protégé par la loi sur la conservation de la nature.	a)	L'Hermine.	b)	Le Chat sylvestre (Chat sauvage).	c)	La Belette.
15.	Pour la chasse à tir du Renard, l'utilisation d'une carabine d'un calibre .22	a)	est autorisée, quel que soit le mode de chasse.	b)	est autorisée, uniquement pour la chasse à l'approche et à l'affût.	c)	est interdite, quel que soit le mode de chasse.

**BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)**

16.	Laquelle des affirmations suivantes concernant le Cerf est vraie ?	a)	Les dégâts d'écorcement peuvent être provoqués par le dérangement des animaux.	b)	Les dégâts d'abrouissement à la végétation ligneuse ne sont commis que par les non-boisés.	c)	Le Cerf ne commet pas de dégâts aux cultures agricoles.
17.	Pour stabiliser les effectifs d'une population de Cerf en équilibre, il convient de prélever chaque année environ	a)	10 % du nombre d'animaux estimé au printemps avant les naissances.	b)	30 % du nombre d'animaux estimé au printemps avant les naissances.	c)	60 % du nombre d'animaux estimé au printemps avant les naissances.


18.	S'il n'est pas chassé, la longévité d'un sanglier peut atteindre de l'ordre de	a)	8 à 10 ans.	b)	15 à 20 ans.	c)	30 à 35 ans.
19.	Dans une population sauvage de sangliers et au cours d'une année normale, la portée d'une laie adulte est en moyenne de l'ordre de	a)	4 à 6 marcassins.	b)	8 à 10 marcassins.	c)	12 à 14 marcassins.
20.	La Fouine et le Chevreuil ont en commun	a)	une diapause embryonnaire (ou gestation différée).	b)	un régime alimentaire essentiellement herbacé.	c)	une mise bas en mars.
21.	Concernant le Chevreuil, quel est le type de dégât le plus vraisemblable qu'il peut commettre en forêt ?	a)	L'écorcement.	b)	Les boutis.	c)	L'abrouissement.
22.	Dans quelle région de Wallonie s'est développée une population de quelques centaines de mouflons en parcours libre ?	a)	Dans les Hautes-Fagnes.	b)	En basse et moyenne Semois.	c)	Dans la vallée de l'Ourthe.
23.	Vis-à-vis du petit gibier, une bande d'herbe ou de terre nue, au pied d'une haie	a)	n'apporte aucun effet, ni positif ni négatif.	b)	constitue une zone intéressante (pouillage, ressui, nourriture...).	c)	le rend plus vulnérable aux maladies.
24.	Le Lièvre consomme préférentiellement	a)	des graminées en croissance.	b)	des graines de plantes cultivées.	c)	des écorces, racines et bulbes.
25.	Chez le Lièvre, si à l'examen des premiers tableaux de chasse de la saison on dénombre moins de jeunes de l'année que d'adultes,	a)	il faut arrêter les prélèvements pour le restant de la saison de chasse.	b)	on doit limiter les prélèvements à 25 % de la population présente à l'ouverture.	c)	on peut prélever sans crainte jusqu'à 50 % de la population présente à l'ouverture.
26.	Le Faisan commun est une espèce	a)	qui est dotée d'une bonne capacité d'adaptation à différents milieux.	b)	qui ne peut se développer naturellement que dans les milieux fortement boisés.	c)	qui ne peut se développer naturellement dans aucun de nos milieux et nécessite dès lors des repeuplements réguliers.
27.	Le Faisan adulte	a)	se perche dans un arbre pour passer la nuit.	b)	construit son nid dans un arbre.	c)	se nourrit, à parts égales, d'aliments d'origine végétale et animale.

28.	L'habitat préféré de la Perdrix grise est constitué	a)	de plaines cultivées ouvertes.	b)	de zones herbagères.	c)	de forêts claires.
29.	L'existence de deux pics d'éclosion (en juin et en juillet) chez la Perdrix grise s'explique par le fait	a)	qu'il y a systématiquement chez cette espèce deux couvées par an.	b)	qu'une couvée de remplacement a lieu si et seulement si la première couvée est détruite avant la naissance des jeunes.	c)	que certaines perdrix réalisent leur unique couvée en juin et d'autres en juillet.
30.	La Bécasse des bois est	a)	une espèce introduite en Wallonie au siècle dernier.	b)	une espèce qui ne niche jamais en Wallonie.	c)	une espèce migratrice partielle en Wallonie.
31.	Cette silhouette appartient vraisemblablement à 	a)	un canard de surface.	b)	un canard plongeur.	c)	une oie.
32.	Lequel de ces gibiers d'eau est un migrateur qui n'hiverné pas chez nous ?	a)	La Poule d'eau.	b)	La Sarcelle d'été.	c)	Le Vanneau huppé.
33.	Lequel des 3 mustélidés suivants est le plus lié au milieu forestier ?	a)	Le Putois.	b)	La Martre.	c)	La Fouine.
34.	La maturité sexuelle du Renard est atteinte vers l'âge de	a)	4 mois.	b)	7 mois.	c)	10 mois.
35.	Le Lapin est un animal	a)	solitaire.	b)	vivant en couple toute l'année.	c)	grégaire.
36.	Chez le Pigeon ramier, une ponte se compose habituellement de	a)	2 œufs.	b)	4-5 œufs.	c)	10-12 œufs.
37.	Cette race de chien se classe essentiellement dans la catégorie des	a)	chiens d'arrêt.	b)	des chiens rapporteurs de gibier.	c)	des chiens de sang.

38.	Ce dégât d'écorcement a été provoqué par	a)	un sanglier.	b)	un castor.	c)	un cerf.
39.	Cet animal est	a)	une genette.	b)	un lapin.	c)	un lièvre.
40.	Cet animal est	a)	un chevreuil.	b)	un daim.	c)	un cerf.
41.	Ce rapace diurne est	a)	un faucon crécerelle mâle.	b)	un faucon pèlerin.	c)	un autour des palombes.
42.	Cet oiseau est	a)	une bernache du Canada.	b)	une ouette d'Egypte.	c)	un tadorne de Belon.
43.	Ce rapace nocturne est une chouette	a)	hulotte.	b)	chevêche.	c)	effraie.
44.	Ces corvidés sont	a)	des corneilles noires.	b)	des choucas des tours.	c)	des corbeaux freux.
45.	Cet oiseau d'eau est	a)	un vanneau huppé.	b)	un grèbe huppé.	c)	un grèbe à cou noir.

**BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)**

46.	Dans un fusil, le deuxième canon étant souvent plus chocké, on y met généralement une cartouche à grenailles	a)	de plus gros diamètre pour tirer un gibier qui s'est éloigné.	b)	de plus petit diamètre pour tirer un gibier qui s'est éloigné.	c)	de même diamètre.
47.	Quel est le diamètre de grains métalliques d'une cartouche le plus adapté pour chasser la Bécasse de bois parmi les 3 cités ci-après ?	a)	2,41 mm.	b)	3,00 mm.	c)	3,40 mm.

48.	Où se trouve l'âme du canon ? 	a)	En 1.	b)	En 2.	c)	En 3.
49.	Le rétrécissement à la bouche de 0,3 mm du diamètre interne du canon d'un fusil correspond à un	a)	1/4 choke.	b)	1/2 choke.	c)	full ou plein choke.
50.	Indiquez la pièce qui ne fait pas partie d'une carabine à verrou de type Mauser.	a)	Le pontet.	b)	La bascule.	c)	Le guidon.
51.	Une balle de calibre .300 Winchester Magnum correspond à un diamètre d'environ	a)	5,58 mm.	b)	6,17 mm.	c)	7,62 mm.
52.	L'utilisation d'une détente douce (stecher)	a)	augmente la sécurité du tir en battue.	b)	favorise la précision du tir à l'affût.	c)	accroît la vitesse de la balle.
53.	Sur une carabine à un seul canon, la présence d'une deuxième détente	a)	signifie que l'arme est équipée d'un stecher.	b)	permet de tirer rapidement une deuxième balle.	c)	n'est observé sur aucun modèle.
54.	Laquelle de ces carabines à un canon ne possède pas de chargeur ?	a)	La carabine à levier de sous-garde.	b)	La carabine à pompe.	c)	La carabine à 1 coup.
55.	Indiquez parmi les 3 lunettes de tir suivantes celle qui possède le plus fort grossissement.	a)	7 x 50	b)	8 x 56	c)	10 x 42
56.	Afin d'éviter de blesser un lièvre, je ne tire pas au-delà d'une distance	a)	de 30-40 mètres.	b)	de 50-60 mètres.	c)	de 70-80 mètres.

57.	Indiquez la bonne attitude pour un chasseur qui a blessé un gibier.	a)	Accompagner le conducteur de chien de sang appelé pour rechercher le gibier blessé.	b)	Baliser la piste du gibier blessé aussi loin que possible avant d'appeler un conducteur de chien de sang.	c)	Quitter immédiatement son poste de battue pour tenter de retrouver le gibier blessé.
58.	En action de chasse, pour fermer mon fusil en toute sécurité,	a)	je relève les canons.	b)	je relève la crosse.	c)	je relève indifféremment les canons ou la crosse.
59.	A mon poste de battue, pour matérialiser un angle de sécurité de 30° vers ma droite, j'effectue	a)	5 pas à droite et 3 pas perpendiculairement.	b)	6 pas à droite et 2 pas perpendiculairement.	c)	3 pas à droite et 2 pas perpendiculairement.
60.	Indiquez l'affirmation exacte.	a)	La portée d'une cartouche à balle tirée dans un canon lisse est inférieure à la portée d'une balle tirée dans un canon rayé.	b)	La portée d'une cartouche à balle tirée dans un canon lisse est supérieure à la portée d'une balle tirée dans un canon rayé.	c)	La portée d'une cartouche à balle tirée dans un canon lisse est équivalente à la portée d'une balle tirée dans un canon rayé.