



Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département de la nature et des forêts
Direction de la chasse et de la pêche

Examen de chasse 2026

Epreuve théorique

Première session

Recueil des questions

Ce cahier se compose de 60 questions numérotées. S'il est incomplet, demandez à l'échanger auprès d'un surveillant.


Rappel :

Une réponse exacte vous donne droit à un point (**+1**)

Une réponse inexacte ou l'absence de réponse n'entraîne ni bonus ni malus (**0**)

Bon examen !

BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)

1.	Sur ce territoire composé de 2 parties, A et B, situé au nord du sillon Sambre et Meuse, la chasse à tir du chevreuil est 	a)	autorisée sur la partie A et sur la partie B.	b)	interdite sur la partie A mais est autorisée sur la partie B.	c)	est interdite sur les deux parties, A et B.
2.	En Région wallonne, la chasse en battue est interdite	a)	durant toute la période comprise entre le coucher officiel et le lever officiel du soleil.	b)	uniquement depuis une demi-heure après le coucher officiel jusqu'à une demi-heure avant le lever officiel du soleil.	c)	uniquement depuis une heure après le coucher officiel jusqu'à une heure avant le lever officiel du soleil.
3.	Une année cynégétique commence	a)	le 1 ^{er} janvier et se termine le 31 décembre.	b)	le 1 ^{er} juillet et se termine le 30 juin.	c)	le 1 ^{er} septembre et se termine le 31 août.
4.	Lequel de ces mammifères est classé comme gibier par la loi sur la chasse ?	a)	Le Blaireau.	b)	L'Ecureuil.	c)	La Fouine.
5.	Le transport et le lâcher de faisans vivants est autorisé durant tout le mois	a)	de janvier.	b)	d'août.	c)	d'octobre.
6.	Laquelle des 3 espèces gibiers suivantes peut être chassée ce samedi 21 février 2026 ?	a)	Le Lapin.	b)	La Bernache du Canada.	c)	Le Canard colvert.
7.	Un restaurant peut-il légalement mettre à la carte un filet de chevreuil ce 21 février 2026 ?	a)	Oui, sans aucun problème.	b)	Oui, à condition que le chevreuil provienne d'un autre pays et que son origine soit licite.	c)	Non, en aucun cas.

8.	La destruction du Sanglier sur le territoire d'un titulaire du droit de chasse peut être autorisée	a)	toute l'année, tout en respectant un certain nombre de conditions.	b)	uniquement en dehors des périodes d'ouverture de la chasse du Sanglier.	c)	uniquement durant les périodes d'ouverture de la chasse du Sanglier si le titulaire de droit de chasse souhaite pouvoir tirer à l'affût de nuit.
9.	Le constat de tir requis pour pouvoir transporter un cerf tiré en exécution du plan de tir doit être rédigé	a)	par le titulaire du droit de chasse sur le territoire où l'animal a été tiré.	b)	par le président du conseil cynégétique dans lequel l'animal a été tiré.	c)	par un agent du département de la nature et des forêts.
10.	L'adhésion d'un titulaire de droit de chasse au conseil cynégétique dans lequel se trouve son territoire de chasse est obligatoire pour lui permettre	a)	de chasser le Lièvre.	b)	d'obtenir des bracelets de traçabilité pour le grand gibier.	c)	de détruire le Sanglier.
11.	Le nourrissage supplétif du grand gibier est autorisé	a)	toute l'année.	b)	uniquement du 1 ^{er} novembre au 30 avril.	c)	uniquement du 1 ^{er} mai au 31 octobre.
12.	Parmi les affirmations qui suivent concernant la chasse au vol en Région wallonne, indiquez celle qui est exacte.	a)	Tout chasseur pratiquant la chasse au vol doit être muni d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse valide.	b)	Quelle que soit l'espèce, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont identiques pour la chasse au vol et la chasse à tir.	c)	La chasse au vol au Nord du sillon Sambre et Meuse n'est permise que sur un territoire d'au moins 25 ha d'un seul tenant.
13.	Le tir avec un fusil d'une cartouche à grains métalliques qui contient plus de 1% de plomb (métal) est interdit	a)	uniquement au-dessus des étangs, rivières et autres étendues d'eau naturelles ou artificielles.	b)	uniquement jusqu'à 50 mètres des zones humides.	c)	jusqu'à 100 mètres des zones humides.
14.	La loi du 14 juillet 1961 encadre la réparation des dégâts causés par le Cerf aux	a)	champs, fruits et récoltes.	b)	peuplements forestiers.	c)	champs, fruits et récoltes et aux peuplements forestiers.
15.	Indiquez parmi les animaux cités ci-après celui qui est protégé par la loi sur la conservation de la nature.	a)	L'Hermine.	b)	Le Chat sylvestre (Chat sauvage).	c)	L'Oie des moissons.


BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)

16.	Chez le Cerf, les animaux les plus âgés perdent leur bois	a)	avant les jeunes cerfs.	b)	en même temps que les jeunes cerfs.	c)	après les jeunes cerfs.
17.	Indiquez la pointure du trophée de Cerf représenté sur ce schéma. 	a)	6-cors irrégulier.	b)	12-cors irrégulier.	c)	10-cors irrégulier.
18.	La hauteur au garrot (point le plus haut du dos, à la jonction avec le cou) d'un chevreuil adulte se situe entre	a)	60 et 80 cm.	b)	100 et 120 cm.	c)	140 et 160 cm.
19.	Dans nos contrées, si on veut caractériser le Chevreuil, on dira généralement qu'il s'agit d'un animal	a)	de plaine.	b)	de lisières et de milieux de transition.	c)	forestier.
20.	En conditions normales, s'il n'est pas dérangé, le Mouflon est	a)	essentiellement diurne.	b)	essentiellement nocturne.	c)	autant diurne que nocturne.
21.	Le Sanglier est un omnivore opportuniste dont le régime alimentaire se compose généralement	a)	d'environ autant de nourriture végétale que de nourriture animale.	b)	majoritairement de nourriture végétale.	c)	majoritairement de nourriture animale.
22.	Le taux d'accroissement annuel d'une population de sangliers	a)	est constant.	b)	est fluctuant selon les années.	c)	ne dépasse jamais 100 %.
23.	Parmi les 3 types d'habitat suivants, indiquez celui où on devrait normalement observer les densités de Lièvre les plus élevées dans des conditions favorables.	a)	Les zones de grandes cultures.	b)	Les zones boisées.	c)	Les zones humides.

24.	En Ardenne, on trouve	a)	des populations de lièvres d'Europe et de lièvres variables.	b)	uniquement des populations de lièvres variables.	c)	uniquement des populations de lièvres d'Europe.
25.	Chez la Perdrix grise adulte, quel est le critère le plus sûr pour être certain d'être en présence d'une femelle ?	a)	Les plumes scapulaires (plumes de l'aile les plus rapprochées du corps) présentent des rayures claires en forme de croix de lorraine (raie longitudinale avec des raies transversales).	b)	La présence d'une tâche brune en forme de fer à cheval sur le bas de la poitrine.	c)	La couleur des pattes.
26.	Les jeunes perdreaux quittent le nid	a)	rapidement après l'éclosion.	b)	une dizaine de jours après l'éclosion.	c)	une vingtaine de jours après l'éclosion.
27.	Chez le Faisan commun, la plupart des éclosions ont normalement lieu en	a)	mars-avril.	b)	mai-juin.	c)	août-septembre.
28.	Le Faisan commun est une espèce	a)	qui est dotée d'une bonne capacité d'adaptation à différents milieux.	b)	qui ne peut se développer naturellement que dans les milieux fortement boisés.	c)	qui ne peut se développer naturellement dans aucun de nos milieux et nécessite dès lors des repeuplements réguliers.
29.	La Bécasse des bois se nourrit	a)	presque exclusivement de végétaux herbacés (graminées...).	b)	presque exclusivement de graines.	c)	presque exclusivement d'animaux (vers de terre, larves d'insectes...).
30.	Cette silhouette appartient vraisemblablement à 	a)	un canard de surface.	b)	un canard plongeur.	c)	un cormoran.
31.	Chez le Renard, les jeunes deviennent autonomes et partent, pour la plupart d'entre eux, à la recherche de leur propre territoire	a)	au printemps.	b)	en été.	c)	en hiver.
32.	Lequel des 3 mustélidés suivants se montre le plus volontiers consommateur de fruits ?	a)	La Fouine.	b)	Le Putois.	c)	La Belette.

33.	Les lapereaux sont très sensibles	a)	à la sécheresse.	b)	aux fortes pluies.	c)	au gel.
34.	Les taches blanches sur les côtés du cou du Pigeon ramier adulte caractérisent	a)	les oiseaux mâles uniquement.	b)	les oiseaux femelles uniquement.	c)	les oiseaux des deux sexes.
35.	Le Lapin peut commettre des dégâts	a)	uniquement aux plantations ligneuses.	b)	uniquement aux cultures agricoles.	c)	aux plantations ligneuses et aux cultures agricoles.
36.	Laquelle de ces 3 maladies est transmissible à l'homme ?	a)	La peste porcine africaine.	b)	La trichinose.	c)	La maladie d'Aujeszky.
37.	Cet animal est un	a)	un chevreuil.	b)	un daim.	c)	un cerf.
38.	Cet oiseau d'eau est	a)	un grèbe castagneux.	b)	une foulque macroule.	c)	une poule d'eau.
39.	Cette empreinte de 4 cm de longueur d'un animal adulte appartient à un	a)	sanglier.	b)	cerf.	c)	chevreuil.
40.	Ces oiseaux sont	a)	des perdrix grises.	b)	des cailles des blés.	c)	des poules faisanes.
41.	Ce rapace nocturne est	a)	une chouette hulotte.	b)	une chouette chevêche.	c)	une effraie des clochers.
42.	Ce corvidé est	a)	une corneille noire.	b)	un corbeau freux.	c)	un choucas des tours.
43.	Ce colombidé est	a)	une tourterelle des bois.	b)	une tourterelle turque.	c)	un pigeon biset.
44.	Cette race de chien est plus spécialisée comme	a)	chien d'arrêt.	b)	chien rapporteur de gibier.	c)	chien de recherche au sang.
45.	Il s'agit le plus vraisemblablement d'un terrier de	a)	lapin.	b)	lièvre.	c)	blaireau.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)

46.	Où se trouve la chambre du canon ? 	a)	En 1.	b)	En 2.	c)	En 3.
47.	Quel est l'élément qu'on trouve uniquement dans une munition pour fusil ?	a)	L'étui.	b)	L'amorce.	c)	La bourre.
48.	On utilisera de préférence des cartouches à grenailles métalliques n° 2 pour le tir	a)	du Lapin.	b)	du Renard.	c)	de la Bécasse des bois.
49.	Lequel des fusils cités ci-après possède le plus grand diamètre de l'âme du canon ?	a)	Le calibre 16.	b)	Le calibre 20.	c)	Le calibre 410.
50.	Le rétrécissement à la bouche de 0,3 mm du diamètre interne du canon d'un fusil correspond à un	a)	1/4 choke.	b)	1/2 choke.	c)	full ou plein choke.
51.	Lorsque sur la douille d'une cartouche à balle figure l'inscription 7 x 64, le chiffre 64 indique	a)	le diamètre de la balle en dixième de mm.	b)	la longueur de la douille en mm.	c)	le poids de la balle en grammes.
52.	L'organe de visée se trouvant à proximité de la bouche du canon d'une carabine s'appelle	a)	le cran de mire.	b)	le guidon.	c)	la hausse.
53.	Idéalement, au moment de l'impact, une balle de carabine de chasse	a)	doit éclater en plusieurs morceaux.	b)	ne peut subir aucune déformation.	c)	doit se déformer en champignon.
54.	L'utilisation d'un stecher est adaptée pour le tir	a)	en battue.	b)	à l'affût.	c)	en battue comme à l'affût.

55.	Les rayures du canon d'une carabine servent à	a)	accroître la précision du tir.	b)	réduire le recul de l'arme.	c)	augmenter l'énergie du projectile à la sortie du canon.
56.	Toutes autres choses restant égales, plus une balle est légère	a)	plus son énergie cinétique est élevée.	b)	plus son énergie cinétique est faible.	c)	plus elle est adaptée pour le tir d'animaux corpulents, tels que le Cerf et le Sanglier.
57.	Normalement, la portée maximum de la grenaille métallique n° 4 est	a)	plus élevée que celle de la grenaille métallique n° 7.	b)	plus élevée que celle de la grenaille métallique n° 2.	c)	plus faible que celle de la grenaille métallique n° 6.
58.	Sur une lunette de visée, vous lisez les indications suivantes : 3-12 x 56. Le nombre 56 renseigne	a)	le diamètre de l'oculaire.	b)	le diamètre de l'objectif.	c)	l'indice crépusculaire.
59.	En battue, parmi les 3 actions suivantes, indiquez la seule qui soit admissible.	a)	Tirer sur un sanglier à l'arrêt.	b)	Tirer sur un sanglier lorsqu'il s'apprête à rentrer dans l'enceinte.	c)	Tirer sur un sanglier à travers un buisson.
60.	Afin d'éviter de blesser un lièvre, je ne tire pas au-delà d'une distance	a)	de 30-40 mètres.	b)	de 50-60 mètres.	c)	de 70-80 mètres.